

	WH 44	WH 45	WH 46	WH 55	WH 56	WH 58	WH 65	WH 67	WH 68	WH 86
<i>Libythea celtis</i> (Laicharting, 1782)	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-
<i>Limenitis reducta</i> (Staudinger, 1901)	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Vanessa atalanta</i> (F., 1807)	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+
<i>Cynthia cardui</i> (L., 1758)	+	+	×	+	□	-	-	-	-	-
<i>Nymphalis polichloros</i> (L., 1758)	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-
<i>Polygonia c-album</i> (L., 1758)	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Euphydryas desfontainii</i> (Godart, 1829)	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rot., 1775)	-	+	×	×	□	-	-	-	-	-
<i>Melitaea deione</i> (Geyer, 1832)	-	×	□	+	□	-	-	-	-	-
<i>Melitaea athalia</i> (Rot., 1775)	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Melitaea parthenoides</i> (Keferst., 1851)	-	+	+	+	□	-	-	-	-	-
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1779)	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Melitaea cinxia</i> (L., 1758)	+	×	×	×	-	-	-	-	-	-
<i>Melitaea phoebe</i> (D. & Schif., 1775)	-	+	×	+	×	+	-	-	-	-
<i>Brenthis hecate</i> (D. & Schif., 1775)	+	+	×	×	□	-	-	-	-	-
<i>Brenthis daphne</i> (D. & Schif., 1775)	-	+	+	×	-	-	-	-	-	-
<i>Issoria lathonia</i> (L., 1758)	-	×	×	+	□	-	-	-	-	-
<i>Fabriciana niobe</i> (L., 1758)	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-
<i>Fabriciana adippe</i> (D. & Schif., 1775)	+	×	×	×	+	-	-	-	-	-
<i>Mesoacidalia aglaja</i> (L., 1758)	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Argynnis paphia</i> (L., 1758)	-	+	+	×	-	-	-	-	-	-
<i>Pandoriana pandora</i> (D. & Schif., 1775)	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-
n.º de spp. por cuadrícula	8	21	19	22	9	3	—	—	—	1

Número total de especies: 22.

**Tabla 1e.** Lista y distribución de los Ninfálidos de las Sierras de Alcaraz y Calar del Mundo.

+: citas de la bibliografía

×: citas de la bibliografía confirmadas con capturas

□: nuevas citas

Otras especies citadas de Albacete, fuera de la zona: *Charaxes jasius* (L., 1766) de Almansa, XJ60, (ANDÚJAR et al., 1985).