

	WH 44	WH 45	WH 46	WH 55	WH 56	WH 58	WH 65	WH 67	WH 68	WH 86
<i>Brintesia circe</i> (F., 1775)	+	×	+	+	.	+
<i>Satyrus actaea</i> (Esper, 1780)	.	+	+	+	.	+
<i>Hipparchia alcyone</i> (D. & Schif., 1775)	.	×	×	+	.	.	.	□	.	.
<i>Hipparchia semele</i> (L., 1758)	.	+	×	×	.	+	.	□	.	.
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	.	+	+	+	.	+
<i>Pseudotergumia fidia</i> (L., 1767)	.	.	+
<i>Chazara briseis</i> (L., 1764)	.	+	+	+	+
<i>Pararge aegeria</i> (L., 1758)	+	×	×	×	.	+
<i>Lasiommata megera</i> (L., 1767)	+	+	.	+	□
<i>Lasiommata maera</i> (L., 1758)	.	+	×	+
<i>Coenonympha dorus</i> (Esper, 1782)	.	+	.	+	□	+
<i>Coenonympha pamphilus</i> (L., 1758)	.	×	×	×	□
<i>Melanargia lachesis</i> (Hübner, 1790)	.	×	×	×	□	.	.	□	.	.
<i>Melanargia occitanica</i> (Esper, 1794)	.	.	.	+
<i>Melanargia ines</i> (Hoffmannsegg, 1804)	□	.	.
<i>Hyponphele lycaon</i> (Muschamps, 1915)	.	×	+	+	□
<i>Pyronia tithonus</i> (L., 1771)	.	+	+	+	□	+
<i>Pyronia cecilia</i> (Vallantin, 1894)	.	+	+	+	.	+	.	×	.	.
<i>Pyronia bathseba</i> (F., 1793)	+	+	+	+	.	.	.	□	.	.
<i>Maniola jurtina</i> (L., 1758)	.	+	×	+	□
n.º de spp. por cuadrícula	4	18	18	18	9	8	—	5	—	—

Número total de especies: 20.

Tabla 1f. Lista y distribución de los Satíridos de las Sierras de Alcaraz y Calar del Mundo.

+: citas de la bibliografía.

×: citas de la bibliografía confirmadas con capturas.

□: nuevas citas

Otras especies citadas de Albacete, fuera de la zona: *Chazara prieuri* (Picrret, 1837) de Almansa. X160. (ANDÚJAR et al., 1985).