

DATOS DE LOS CARABIDAE COLECTADOS EN LAS LAGUNAS Y EMBALSES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

Tribu **Cicindelini**

Megacephala (Graumognatha) euphratica Dejean, 1822

Elemento mediterráneo meridional. Especie halobia. Saladar de Cordovilla.

Cephalota (Cassolaia) maura (Linnaeus, 1758)

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila que vive en zonas salobres, márgenes de ríos, arroyos y ramblas, colectada en mayo y agosto. Lagunas de Corralrubio, Horna, Pétrola, Salobrelejo, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

Cephalota (Taenidia) circumdata imperialis Klug, 1834

Elemento mediterráneo septentrional. Especie halobia. Salinas de Pinilla.

Cicindela (Calomera) littoralis littoralis Fabricius, 1787

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila, se localiza en enclaves salinos y en la orilla de lagunas interiores y cursos de agua; marzo a diciembre. Lagunas de Casas De VÍllora, Corralrubio, Horna, Pétrola, Saladar, Salobrelejo, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

Cicindela (Cicindela) campestris campestris Linnaeus, 1758

Elemento paleártico. Especie higrófila, vive en bosques, campos y es frecuente observarla en laderas, caminos y terrenos despejados; febrero a junio y en septiembre. Lagunas de Arquillo, Ojos de Villaverde y Pétrola, Saladar de Cordovilla.

Cicindela (Cicindela) maroccana pseudomaroccana Roeschke, 1891

Elemento bético rifeño. Especie de tendencias orófilas; febrero a mayo, en terrenos con mayor contenido salino que la especie anterior. Embalses de Taibilla y Talave, Saladar de Cordovilla.

Cicindela (Cylindera) paludosa (Dufour, 1820)

Elemento mediterráneo occidental. Especie halofila presente preferentemente en enclaves palustres; abril hasta septiembre, más abundante en verano. Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.