

6	K Dientes inferiores del cáliz cuculados L Dientes inferiores del cáliz no cuculados	Cuculados: Con un capuchón interno a modo de caperuza, de manera que para extender todo el diente en un plano es necesario romperlo en su parte apical. A menudo este tipo de dientes calicinales viene acompañado de un mucrón subapical.
7	M Indumento interno del tubo del cáliz con pelos simples únicamente, con presencia de carpostegio N Indumento interno del tubo del cáliz con sólo pelos dendríticos, ausencia de carpostegio O Indumento interno del tubo del cáliz con indumento mixto, integrado por pelos dendríticos y/o ramificados no dendríticos y pelos simples, con presencia de carpostegio	Carpostegio: Pelos que se sitúan en la parte interior del cáliz en la zona de unión entre los dientes calicinales y el tubo, o un poco por debajo de esta zona, cuya función es evitar la prelación de las núcúlas por parte de parásitos, siendo necesario para éstos la perforación del cáliz.
8	P Relación dientes del cáliz / tubo aprox. $\frac{1}{2}$ Q Relación dientes del cáliz / tubo. $< \frac{1}{2}$	
9	R Corola de color amarillo, monocromáticas S Corola de color crema o blanco, a menudo bicolor T Corola de color rosa o púrpuras, a menudo bicolor	Corola bicolor: Los lóbulos presentan un color y la garganta otro. En el caso de las corolas rosadas o purpúreas es frecuente que el dicromatismo se reparta entre lóbulos de color rosado-purpúreo y la garganta de color blanco

	Caracteres y estados de carácter								
Táxones	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>T. × robledoí</i>	A<B	C	E	G	J	L	O	Q	S/T
<i>T. ronnigeri</i>	A	D	F	G	J	L	N/O	Q	R>S
<i>T. lagunae</i>	B	C	F	H	I	L	O	P	S
<i>T. × bicoloreum</i>	B	C	F	G	J	K	O	Q	R
<i>T. miragestorum</i>	A	D	E	G	J	L	O	Q	S