

<i>Trinia glauca</i> (<i>T. glauca</i> subsp. <i>glauca</i>) / <i>Trinia dufourii</i> (<i>T. glauca</i> subsp. <i>dufourii</i> , <i>T. esteparia</i>)							
Planta	Tallos	Hojas	Pedúnculos	Brácteas	Involúcelo (bractéolas)	Fruto (mericarpes)	Pedícelos
DC. (1830)	glabra / glaberríscula				nulo o "x-hojas" / subnulo	costillas obusas / pubérulo subrotundo, costillas obtusas	apenas más largos que los frutos
Dufour (1860)	glabra	hojas en ramos con peciolo membranáceo enteros				ovado, subgloboso, glabro 10-sulcado	lugaros rocosos áridos. Tudela y Xerta
Lange (1880)	glabra	hojas de los ramos superiores reducidas a peciolo membranáceo enteros				glabro, liso / ovado, subgloboso, 10-sulcado glabro (y pubérulo DC.)	colinas y planicies inculas, suelo principalmente calcáreo. Europa media y austral / lugaros rocosos áridos. Tudela y Xerta
Wolff (1910)		hojas superiores con unas cuantas lacinias / hojas superiores reducidas a vainas anchas					hasta 5 veces más largos que los frutos maduros / apenas más largos que el fruto maduro o menores
Cannon (1968)*	glabra	hasta 50 cm		ausentes o pocas	bractéolas ausentes	2-3 mm	O, C y S de Europa /
Arenas y García (1993)						elipsoide. Totalmente glabro, 2,3-3,3 mm. Vitas ausentes. Costillas primarias algo prominentes, al menos en sección transversa subagudas / ovoide a subgloboso. Totalmente glabro, 1-1,4 mm. Vitas numerosas. Costillas primarias anchas y obtusas, muy prominentes	linderos de bosques y pastos secos; preferentemente calcícola. O, S y C de Europa y N de Irán / cerros arcillosos. Endemismo riojano
Aizpuru y cols. (1999)		segmentos de los foliolos glabros o con bordes escabridos / segmentos de los foliolos por lo general pubérulo-papilosos, rara vez glabros			generalmente nulo, a veces con 1-3(7) bractéolas / con (2)3-6 bractéolas	glabros / más o menos muricados-papilosos	matrallales y pastos pedregosos en ambiente de quejigares y carrascales; Ca; 200-2400 m / terrenos arcillosos y yesosos con pastos xerófilos; 250-600 m. Endemismo del Valle del Ebro
Jury (2003)	glabra / glabra	hasta de 35 cm / ± delgado / peciolo no bastante especialmente delgados 25 cm	más largos que los radios / mucho más largos que los radios	0-1, trifida / inexistentes	(0-5, simples ó 2-3 fidas) / 3-6, indivisas	2,3-3,3 mm glabros. Costillas primarias neas claramente redondeadas pero no grandes / 1-1,4(2) mm, escabridos. Costillas primarias muy desarrolladas, anchas, obtusas	pastos secos y ± pedregosos en substrato calizo; 30-2300 m. W, C y S de Europa –por el N hasta el S de Inglaterra–, SW de Asia, N, C y E de la Península Ibérica. (Fig. 1) / suelos áridos, arcillosos, muchas veces con <i>Lycium spartum</i> ; c. 300 m. N de España. (Fig. 1)

Tabla 1.- Algunos caracteres diagnósticos y diferenciales de *Trinia glauca* (negro) y *T. dufourii* (anaranjado), tomados de bibliografía. *Cannon (1968) considera a *T. dufourii* una variante menor de *T. glauca* cuyo único carácter diferencial sería que las hojas superiores caulinares carecen de lámina.