

Descripción (Figura 30): Rizoma: corto, cubierto de páleas ferrugíneas lineares. Frondes: fasciculadas de hasta 25 cm. Pecíolo: de color castaño rojizo y cubierto de páleas, menos oscuras que las del rizoma. Lámina: de longitud similar al pecíolo, oval-lanceolada y 2-3 veces pinnada. Pínnulas: oblongas, profundamente festoneadas, glabras o con páleas en el envés. Venas: dicótomas, libres. Soros: marginales, en la zona distal de las venas, con pseudoindusio discontinuo y amplio, de margen fimbriado, blanquecino en principio y terminando en una coloración ferrugínea. Esporas: subesféricas, de 43 a 70 μm y perisporio granuloso. Esporulación: de febrero a septiembre.

Ecología y biotipo: Especie colonizadora de repisas y grietas de roquedos calizos, así como muros en lugares secos y por lo general soleados. 0-1000 m. Hemicriptófito.

Corología: Regiones Mediterránea e Irano-Turaniana. Está repartida por toda la Península Ibérica, sobre todo por su mitad oriental. En Albacete la encontramos en zonas del sureste (Sierra de las Cabras, Hellín) y noreste (Casas de Ves) (Figura 29).

Notas: Esta especie se diferencia del resto de representantes de este género por presentar el borde del pseudoindusio fimbriado.

***Cheilanthes hispanica* Mett., in Abh Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)**

Familia: PTERIDACEAE

Descripción (Figura 32): Rizoma: corto, cubierto de páleas castaño-oscuro, linear-lanceoladas. Frondes: fasciculadas, de hasta 25 cm. Pecíolo: al menos dos veces mayor que la lámina, castaño oscuro, glabrescente excepto en la base, que se encuentra cubierta de páleas. Lámina: deltoidea a oblongo-deltoidea, bi o tripinnada. El raquis presenta pelos glandulares largos. Pínnulas: de oblongas a suborbiculares, pequeñas y, a veces, crenadas. El envés se encuentra densamente cubierto de pelos glandulares largos. Venas: inapreciables. Soros: marginales, con pseudoindusio discontinuo, muy estrecho, con lóbulos redondeados y margen entero. Esporas: subesféricas, de 39 a 50 μm de diámetro, con perisporio granuloso. Esporulación: de abril a noviembre.

Ecología y biotipo: Constituye un elemento xerófilo que forma parte de las comunidades de grietas de roquedos silíceos secos y soleados. 400-700 m. Hemicriptófito.

Corología: Región Mediterránea occidental. En la Península, se distribuye fundamentalmente por el centro y oeste, estando ausente en las Islas Baleares. Su distribución en Albacete queda restringida a zonas de la Sierra de